

TOP FINISH

REPARADOR DE RUTAS METABÓLICAS DE TRASLOCACIÓN Y MADURACIÓN DE CULTIVOS

1. DATOS GENERALES

TOP FINISH es un reparador de rutas metabólicas de origen natural, que activan la translocación eficiente de nutrientes como azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos desde las hojas hacia los órganos cosechables, yemas y estructuras productivas. Su poderosa acción bioestimuladora, genera la producción endógena de etileno, hormona clave en el proceso de maduración; esto contribuye a mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos.

2. MODO DE ACCIÓN

TOP FINISH activa las enzimas que accionan estos procesos, aumentan la tasa respiratoria favoreciendo la transformación del aminoácido metionina precursor de la producción natural de etileno en las hojas, acelerando los procesos de maduración, senescencia y translocación de nutrientes hacia los órganos de reserva y aquellos de interés productivo.

3. CARACTERÍSTICAS

- **TOP FINISH** es un complejo natural compuesto por minerales integrados bajo la tecnología BP2 (Molécula Peptídica carbohidratada) presente en nuestras formulaciones.
- La tecnología BP2 encapsula y recombina con los minerales, formando cofactores enzimáticos, detonando una serie de procesos bioquímicos que estimulan la producción natural de etileno endógeno, optimizando la maduración y desarrollo de los cultivos.

4. COMPOSICIÓN

Materia orgánica: 5%

Magnesio (MgO): 10%

Potasio (K₂O): 23%

Azufre (S): 7%

Hierro (Fe): XX%

5. MODO DE APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN

- **TOP FINISH** es un producto totalmente soluble, de acción translaminar, que actúa sobre el área aplicada. Se recomienda utilizar un volumen de agua suficiente para asegurar la cobertura total del área a tratar.
- **TOP FINISH** debe aplicarse en cultivos caducifolios después de la cosecha y durante el período de agoste.
- En cultivos como arroz, espárrago, páprika, leguminosas, maíz, vid, algodón y caña de azúcar, debe aplicarse cuando el cultivo esté en plena madurez, lo que favorece un notable incremento en el peso y la calidad de los órganos cosechables.
- En caña de azúcar, mejora el porcentaje de sacarosa.

CULTIVOS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
VID	5 Kg/Ha	Para translocación: fraccionar esta dosis en 3 aplicaciones (1Kg.-2Kg.-2Kg.) con intervalos de 15 días. Iniciar 45 días antes de la poda.
CAÑA DE AZÚCAR	2 Kg/Ha	Aplicar 45-55 días antes de la cosecha.
PAPRIKA	4 Kg/Ha	Aplicar 3-4 semanas antes de la última paña.
LEGUMINOSAS	2 Kg/Ha	Aplicar con el 80% de madurez de vainas.
ALGODÓN	4 Kg/Ha	Aplicar después de la segunda "paña" o con el 60 - 80% de bellotas abiertas.
DURAZNO	2 Kg/Cil 200L	Aplicar después de un agoste de 30 días en variedades suaves como "blanquillo" y 60 días en variedades duras como "huayo". Hacer riego pesado 5-7 días después de la aplicación.
MANZANO	2 Kg/Cil 200L	Aplicar después de un agoste de 60 días. Regar 3-5 días antes y 3-5 días después de la aplicación. En altitudes mayores a 500 m.s.n.m. se debe acompañar con 2-4 Kg de nitrato de potasio.

6. COMPATIBILIDAD

- TOP FINISH es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes comúnmente usados con excepción de los de reacción alcalina.
- Para la mezcla con otros plaguicidas se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad.

7. PERIODO DE REINGRESO AL CAMPO

TOP FINISH no presenta restricciones luego de realizar la aplicación en las áreas de tratamiento, su degradación y metabolismo se produce de una forma totalmente natural a compuestos naturales que no presentan efecto tóxico alguno.

8. PRESENTACIONES

TOP FINISH es comercializado en presentaciones de: 2Kg.

9. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Se recomienda, al manipular el producto TOP FINISH, hacerlo utilizando un equipo de protección personal completo (overol, anteojos, guantes, etc.).
- Se recomienda realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. No comer o beber durante la preparación de la mezcla.
- El contacto directo con los ojos puede producir irritación, para lo cual se recomienda lavar con abundante agua.
- En caso de ingesta puede producir náuseas y problemas abdominales, en tal caso se debe inducir al vómito.
- Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación, no exponer al sol por periodos prolongados de tiempo.
- Mantener alejado de los niños, animales domésticos y alimentos.